



INSTITUT DE
CARDIOLOGIE
DE MONTRÉAL

Projet: Myotoxicité aux Statines

Si vous êtes un professionnel de la santé et que vous avez des patients qui répondent aux critères suivants, nous vous serions reconnaissants de nous les référer.

Inclusions

- Homme ou Femme; 18 ans et plus
- Documentation d'une **TOXICITÉ MUSCULAIRE** actuelle ou passée **RELIÉE AUX STATINES**

De l'une ou l'autre des façons suivantes :

- Douleur musculaire qui a lieu pendant le traitement des statines et qui cesse après l'arrêt du médicament ou la réduction de la dose.
- Douleur musculaire pendant le traitement aux statines chez des patients dans l'impossibilité d'arrêter le traitement.
- Changement du traitement aux statines à l'ézétimibe en raison d'intolérance manifestée par : douleurs musculaires, faiblesse, myopathie ou rhabdomyolyse.
- Élévation des CK de 1.5 x la limite supérieure normale pendant le traitement en l'absence de toutes autres causes cliniques.
- Présence de myoglobulinurie ou myoglobulinémie pendant le traitement de statine en absence de toutes autres causes cliniques.
- Diagnostic clinique de rhabdomyolyse reliée à la prise de statines.

Contacter au : Tél. (514) 376-3330

- **Guylaine Lucier, poste 3068**
- **Chantale Deslauriers, poste 2429**



INSTITUT DE
CARDIOLOGIE
DE MONTRÉAL

Exclusions

- Hypothyroïdisme qui n'est pas contrôlé avec une dose stable de suppléments pour au moins 3 mois.
- Hyperthyroïdisme connu au cours de la dernière année.
- Histoire d'abus de drogue ou d'alcool dans la dernière année.
- Insuffisance rénale avec une créatinine $\geq 200 \mu\text{mol/L}$ ou plus au moment de la toxicité musculaire.
- Histoire de maladies sévères au foie (cirrhose, hépatite infectieuse etc..) au moment de la toxicité musculaire.
- Maladie musculaire héréditaire ou acquise.
- Toute condition médicale ou psychiatrique qui pourrait rendre le patient inapte à participer à l'étude, selon l'opinion du médecin.
- Participation à un essai clinique dans les 30 derniers jours précédant le recrutement.